Title	Beiträge zur Curculionidenfauna von Mandschukuo. 1. (Attelabinae, Apoderinae und Rhynchitinae)
Author(s)	KONO, Hiromichi
Citation	INSECTA MATSUMURANA, 15(3): 75-79
Issue Date	1941-03
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/9464
Right	
Туре	bulletin
Additional Information	



## BEITRÄGE ZUR CURCULIONIDENFAUNA VON MANDSCHUKUO. I.

(ATTELABINAE, APODERINAE und RHYNCHITINAE)

Von

## HIROMICHI KÔNO (河 野 廣 道)

Für die vorliegende Arbeit stand mir das Material grösstenteils aus der Sammlung des Entomologischen Museums der Kaiserlichen Hokkaido Universität zu Sapporo zur Verfügung.

# UNTERFAM. ATTELABINAE Tribus Euopini

## 1. Euops (Synaptops) splendida Voss f. koreana Voss

Euops (Synaptops) splendens ROELOFS f. koreana VOSS, Stett. Ent. Zeit., 85, p. 297 (1925).

Fundorte: Yuichuan, 1 & , 29/V. 1938, leg. T. Tsuchiyama; Tomonrei (土們嶽), 1 & , 19/VIII. 1939, leg. H. Kôno; Taizôzan (大象山), 1 & u. 1 ♀ , 2/VII. 1938, leg. I. Okada.

Geographische Verbreitung: Kiushu; Korea; Mandschukuo; Sibirien.

# UNTERFAM. APODERINAE Tribus Hoplapoderini

#### 2. Tomapoderus ruficollis (Fabricius) f. tsuchiyamai n. f.

Tomapoderus ruficollis f. a Voss, Stett. Ent. Zeit., 87, p. 79 (1926).

Färbung rot; Flügeldecken stahlblau; Kopf in der Mitte zwischen den Augen mit einem schwarzen Makel; Mittel- und Hinterbrust (excl. die Seitenstücke) und die Mitte des Bauches schwarz. Fühler dunkel, an der Basis rot.

Fundorte: Yuichuan, 1 , 29/V. 1938, leg. T. Tsuchiyama; Môkasai (孟家塞), 1 ♀, leg. I. Окада.

G. V.: Korea (Kugatsusan, 1 &, 21/VIII. 1935, leg. K. Kim; Chôjusan, 1 &, 5/VII. 1935, leg. K. Kim; Kainei, 1 &, 9/VIII. 1930, leg. H. Furukawa); Mandschukuo, Nord-China (nach Voss, 1926).

## 3. Paroplapoderus (Gomadaranus) turbidus Voss

Paroplapoderus turbidus Voss, Stett. Ent. Zeit., 87, p. 45, 63 (1926).

Fundort: Berg Ryutan, 19, 28/V., leg. T. ARAKAWA.

G. V.: Korea; Mandschukuo; China.

## 4. Phymatapoderus flavimanus (Motschulsky)

Apoderus flavimanus MOTSCHULSKY, SCHRENCK'S Reise, p. 171 (1860); FAUST, Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 295 (1882); SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 48 (1889).

Apoderus subornatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 47 (1889). n. syn.

Phymatapoderus subornatus Voss, Stett. Ent. Zeit., 87, p. 73 (1926).

Fundort: Yuichuan, 1 &, 21/V. 1939, leg. T. Tsuchiyama.

G. V.: Sachalin; Hokkaido; Mandschukuo; Sibirien.

## Tribus Apoderini

### 5. Apoderus coryli (Linné)

Attelabus coryli Linné, Syst. Nat. ed. X, p. 384 (1758).

## f. collaris (Scopoli)

Curculio collaris Scopoli, Ent. Carn., p. 25 (1763).

Fundorte: Tetsurei (鐵嶺), I & u. I ♀, I8/VII. 1936, leg. R. Кімізніма, I &, 20/VI. 1937, leg. I. Окада; Yuichuan, I ♀, 29/V. 1938, leg. T. Tsuchi-YAMA.

## f. dubia (GORTANI et GRANDI)

Attelabus coryli var. dubia Gortani et Grandi, Riv. Col. Ital., II, p. 171 (1904).

Fundorte: Tetsurei, 1 &, 18/VI. 1936, leg. R. Kimishima; 1 &, 20/VI. 1937, leg. I. Okada; Taizôzan, 1 &, 2/VII. 1938, leg. I. Okada.

#### f. ruficeps (REY)

Apoderus ruficeps REY, Echange, p. 73 (1893).

Fundorte: Peian (社会), 1 ♀, 12/VIII. 1939, leg. H. Kôno; Yuichuan, 1 ♀, 29/V. 1938, leg. T. Tsuchiyama; Tetsurei, 1 含, 18/VI. 1936, leg. R. Кіміshima; 1 ♀, 20/VI. 1937, leg. I. Окара; Taizôzan, 1 ♀, 2/VII. 1938, leg. I. Окара.

G. V.: Korea; Mandschukuo; Sibirien; Europa.

## 6 Apoderus (Compsapoderus) erythropterus (Zschach)

Attelabus erythropterus ZSCHACH, Mus. Leske, p. 23 (1788).

Apoderus (Compsapoderus) erythropterus Voss, Stett. Ent. Zeit., 88, p. 64 (1927); Kôno, Journ.

Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ., XXIX, 2, p. 68 (1930).

Fundorte: Hengtaohotze (黃道河子), 1 & , 24/VII. 1940, leg. H. ТАКАНАSI; Yuichuan, 1 ♀, 29/V. 1938, leg. T. TSUCHIYAMA; Taizôzan, 1 & , 30/V. 1938, leg. I. Окада; Môkasai, 2 & , 2/VII. 1938, leg. I. Окада.

G. V.: Sachalin; Mandschukuo; Europa.

### Tribus Trachelophorini

## 7. Cycnotrachelus coloratus (FAUST)

Apoderus coloratus FAUST, Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 292 (1882).

Apoderus (Cycnotrachelus) coloratus SCHILSKY, Käf. Eur., 40, 80 (1903).

Cycnotrachelus coloratus Voss, Stett. Ent. Zeit., 90, p. 122 (1929); Kôno, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ., XXIX, 2, p. 72 (1930).

Fundort: Kaigen (開原), I ♀, leg. I. OKADA.

G. V.: Korea; Mandschukuo; Sibirien.

### 8. Cycnotrachelus ussuriensis Voss

Cycnotrachelus ussuriensis Voss, Koleop. Rundsch., 17, p. 194, Q (1931).

3. Kopf konisch, fast anderthalbmal so lang wie breit; unpunktiert. Augen mässig vorgewölbt und aus der Kopfwölbung vortretend. breiter als der Rüssel, mit 2 Längsfurchen. Rüssel 14 mal so lang wie breit, im basalen Teil nahezu parallelseitig, vorn verbreitert, fein punktiert, vor der Mitte höckerartig vorgewölbt zur Aufnahme der Fühler; Basalhälfte auf dem Rücken mit 2 Längsfurchen; die Aufwölbung der Länge nach gefurcht. Fühler dicht vor der Mitte des Rüssels eingefügt; Schaftglied keulenförmig; das erste Geisselglied etwas länger als breit, oval, das 3te viel länger als das 2te, das 4te ein wenig länger als das 3te, das 5te so lang wie das 4te, das 6te kürzer als das 5te, das 7te noch etwas kürzer. Das erste und 2te Keulenglied gleich lang, das 3te ein wenig kürzer als das 2te, das Endglied spitz konisch ausgezogen. Halsschild so lang wie breit, konisch, seitlich fast geradlinig, hinter dem Vorderrand und vor der Basis schwach eingeschnürt, in der Mitte quer gefurcht; ohne Punktierung. Schildchen quer trapezförmig. Flügeldecken länger als zusammen breit; die Punktstreifen vorn mässig kraftig, hinten schwächer werdend; die Zwischenräume der Streifen breit und flach, sehr fein punktiert, der 2te und 4te Zwischenraum an der Basis gewölbt. Pygidium zerstreut punktiert. Unterseite weitläufig punktiert. Schienen schlank, fast gerade.

Färbung schwarzblau; Fühler und Augen schwarz. Epimeren der Hinterbrust kurz anliegend behaart.

Körperlänge: 5 mm.

Fundort: Taizozan, 1 &, 2/VII. 1938, leg. I. OKADA.

G. V.: Ussuri; Mandschukuo; China.

## 9. Paracycnotrachelus longiceps (Motschulsky)

Apoderus longiceps Motschulsky, Schrenck's Reise, p. 173, t. 10, f. 29 (1860).

Apoderus chinensis JEKEL, Ins. Saund., II, p. 164, t. III, f. 4 (1860).

Paracycnotrachelus longiceps Voss, Stett. Ent. Zeit., 90, p. 131 u. 143 (1929); Kôno, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ., XXIX, 2, p. 73 (1930).

Fundorte: Yuichuan, 1 &, 21/V. 1939, leg. T. Tsuchiyama; Zogeyama (象牙山), 1 &, 31/V. 1936, leg. R. Kimishima; Taizôzan, 3 & u. 3 ♀, 2/VII. 1938, leg. I. Окада.

G. V.: Korea; Mandschukuo; China; Sibirien.

## UNTERFAM. RHYNCHITINAE Tribus Auletini

#### 10. Auletobius sanguisorbae (SCHRANK)

Involvulus sanguisorbae SCHRANK, Fn. Boica, I, I, p. 476, 504 (1798).

Auletobius sanguisorbae Voss, Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 238 (1923).

Auletes basilaris GYLLENHAL, in SCHÖNH. Gen. et Spec. Curc., V, 1, p. 346 (1839).

Auletobius (Auletobius) basilaris Voss, Stett. Ent. Zeit., 94, p. 121 (1933); id., l. c., 95, p. 118 (1934).

Fundort: Nailemuto (奈勒穆圖), IEx., 6/VIII. 1940, leg. H. Таканаsı. G. V.: Sachalin; Hokkaido; Mandschukuo; China; Sibirien; Europa.

### Tribus Byctiscini

#### II. Byctiscus rugosus (Gebler)

Rhynchites rugosus Gebler, in Ledebour, Reise Altai-Gebirge, II, No. 3, p. 146 (1830); id., Nouv. Mém. Mosc., II, p. 59 (1830); id., in Schönh. Gen. et Spec. Curc., I, p. 217 (1833); Wasman, Trichterw., p. 243 (1884).

Byctiscus rugosus SCHILSKY, Käf. Eur., 40, 57 (1903).

Byctiscus (Byctiscus) rugosus Voss, Koleop. Rundsch., p. 195, 200 (1930).

Fundort: Yuichuan, 19, 21/V. 1937, leg. T. TSUCHIYAMA.

G. V.: Sachalin; Hokkaido; Korea; Mandschukuo; Sibirien.

#### 12. Byctiscus pubelurus (Motschulsky) f. regalis (Roelofs)

Byctiscus congener Faust (nec Jekel) var. motschulskyi Faust, Hor. Soc. Ent. Ross., p. 429 (1890). Rhynchites regalis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg., XVII, p. 142 (1874).

Byctiscus motschulskyi Lewis, Cat. Jap. Col., No. 1607 (keine Beschreibung); Sharp (nec Faust), Trans. Ent. Soc. Lond., p. 58 (1889).

Byctiscus (Byctiscus) regalis Voss, Koleop. Rundsch., 16, p. 196, 203 (1930).

Byctiscus (Byctiscus) puberulus f. motschulskyi Voss, 1. c., p. 196, 205 (1930).

Byctiscus congener Kôno (nec JEKEL), Journ. Agr. u. Forestry Sapporo, XX, p. 173, f. 1-2 (1929).

Dieses Tierchen ist in Färbung, Fühlerbau und Punktierung ziemlich variabel.

Voss (l. c.) hält *B. puberulus* und *B. regalis* für 2 Arten, aber mir scheint *B. regalis* nicht anders als eine Form von *B. puberulus*.

Fundort: Yuichuan, 18, 20/V. 1938, leg. T. TSUCHIYAMA.

G. V.: Sachalin; Hokkaido; Honshu; Korea; Mandschukuo; Sibirien.

## 13. Byctiscus princeps (Solsky)

Rhynchites princeps Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., VIII, p. 284 (1872).

Byctiscus congener var. princeps FAUST, Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 290 (1882).

Byctiscus (Byctiscus) princeps Voss, Koleop. Rundsch., p. 196, 205 (1930).

Fundort: Yuichuan, 19, 21/V. 1939, leg. T. Tsuchiyama.

G. V.: Mandschukuo; Sibirien.

## Tribus Rhynchitini

### 14. Rhynchites (Rhynchites) confragosicollis Voss

Rhynchites bacchus Takizawa (nec Linné), Journ. Sapporo Soc. Agr. u. Forestry, XXX, 145, p. 171 (1938); Kuwayama, Manshûkoku Shuyô Nôsakumotsu Gaichû Bunpusô oyobi Higai-jôkyô Chôsa Hôkoku, p. 75 (1938).

Rhynchites (Rhynchites) confragosicollis Voss, Koleop. Rundsch., 24, p. 170 (1938).

Fundorte: Chinchou (金洲), 19, 15/V. 1926; Hsingyuehcheng (熊岳城), 19, 17/V. 1930, leg. T. Arakawa.

G. V.: Nord-China; Süd-Mandschukuo.

### 15. Rhynchites (Rhynchites) foveipennis FAIRMAIRE

Rhynchites (Rhynchites) foveirennis FAIRMAIRE, Voss, Koleop. Rundsch., p. 171 (1938).

Rhynchites koreanus Kôno, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XVI, 84, p. 89 (1926). n. syn.

Rhynchites coreanus Takizawa, Journ. Sapporo Soc. Agr. u. Forestry, XXX, 145, p. 171 (1938); Kuwayama, Manshûkoku Shuyô Nôsakumotsu Gaichû Bunpusô oyobi Higai-jôkyô Chôsa Hôkuku, p. 70 (1938).

Fundort: Yuichuan, I & u. I ?, 21/V. 1939, leg. T. TSUCHIYAMA.

G. V.: Korea; Mandschukuo; Nord-China.

## 16. Rhynchites (Involvulus) mandli Voss

Rhynchites (Involvulus) mandli Voss, Koleop. Rundsch., 24, p. 157 (1938).

Fundort: Yuichuan, 12, 29/V. 1938, leg. T. TSUCHIYAMA.

G. V.: Mandschukuo; Sibirien.